

Cette remarquable espèce participe à la fois du *L. Kolbei* Bourg. [*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1889, p. 226 (♂) et *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1900, p. 143 (♀) du Transvaal et du *L. cornipennis* Bourg. [*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 659, ♂, ♀] de Sierra-Leone, tout en étant plus voisine de ce dernier. Elle présente, comme lui, un corselet presque carré, à peine transversal, des élytres à côtes presque obsolètes, largement relevés latéralement en gouttière chez le ♂, avec un forceps acuminé et droit à l'extrémité (chez *L. Kolbei*, le forceps est fortement recourbé au bout en un *muco* aigu); mais les appendices élytraux (♂), au lieu d'être lamelliformes et de naître de la suture comme chez *cornipennis*, sont spiniformes et naissent de la première côte, comme chez *L. Kolbei*, en un point toutefois plus rapproché de la base.

Elle a été découverte par M. le Dr J. Kerandel, médecin-major des troupes coloniales, membre de la mission du Haut-Logone (Commandant Lenfant). Je me fais un devoir de la lui dédier.

CINQ NOUVEAUX HYLOPHILIDES D'AFRIQUE [Col.],

PAR M. PIC, CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Les cinq espèces de Hylophilides que je décris ici font partie des riches Collections du Muséum de Paris; la première a été recueillie au mois de mars par l'infatigable Voyageur naturaliste Ch. Alluaud, lors de son voyage dans l'Afrique orientale allemande, à Kiboseho, dans la zone des forêts (1,700 m. alt.) du Kilimandjaro; les autres sont entrées au Laboratoire d'Entomologie avec la très importante Collection Fairmaire. Parmi les quatre espèces de cette dernière, trois sont originaires de Madagascar, dont deux ont été recueillies par Perrier de la Bathie; une provient de l'île Bourbon; c'est la première espèce connue de cette île.

Hylophilus Caroli nov. sp.

Oblongus, nitidus, griseo pubescens et hirsutus, testaceus, oculis nigris.

Oblong, brillant, orné d'une pubescence grise en partie soulevée, entièrement testacé, un peu roussâtre sur la tête, avec les yeux noirs. Tête pas plus large que le prothorax, tronquée en arrière, à ponctuation très forte et rapprochée; yeux foncés, moyens, écartés entre eux et distants du bord postérieur de la tête; antennes longues, progressivement épaissies, à deuxième article plus gros et plus court que le troisième; dernier, court, obli-

quement tronqué au sommet; prothorax transversal, très arrondi aux angles antérieurs, fortement et densément ponctué; écusson distinct; élytres bien plus larges que le prothorax, peu longs, distinctement rétrécis en arrière, fortement impressionnés à la base avec les bossettes très nettes, à ponctuation très forte et rapprochée; pattes moyennes. Long., 2 millimètres environ.

Afrique orientale allemande : Kilimandjaro (Ch. Alluaud).

Voisin de *H. infasciatus* Pic, mais ponctuation plus fine et plus rapprochée sur les élytres, pubescence moins nette, yeux plus petits, etc.

***Hylophilus Perrieri* nov. sp.**

Brevis et latus, subnitidus, griseo holosericeo pubescens, niger, antennis pedibusque testaceis.

Court et large, peu brillant, orné d'une pubescence grisâtre soyeuse, fine et couchée, noir avec les yeux parfois roussâtres et les membres testacés. Tête large, plus large que le prothorax, subtronquée en arrière, modérément ponctué; yeux très grands, rapprochés entre eux et touchant le bord postérieur de la tête; antennes testacées, un peu rembrunies et épaissies vers l'extrémité, à deuxième article plus court que le troisième; prothorax presque carré, convexe, à faible dépression près de la base et angles antérieurs arrondis, densément ponctué; écusson assez distinct; élytres bien plus larges que le prothorax, relativement courts, faiblement impressionnés près de la base, à ponctuation forte et rapprochée; pattes assez robustes. Long., près de 2 millimètres.

Madagascar (H. Perrier). Aussi *in coll.* Pic.

Par sa forme rappelle *H. minutus* Pic; il en est bien distinct par son prothorax dépourvu d'impressions basales très nettes et la coloration générale noire du dessus du corps.

***Hylophilus basithorax* nov. sp.**

Robustus, subnitidus, griseo holosericeo pubescens, niger, thorace ad basin elytrisque antice et lateraliter rufo notatis, antennis pedibusque pro majore parte testaceis.

Robuste, large, peu brillant, orné d'une pubescence grisâtre soyeuse couchée, noir avec le prothorax bordé de roux et les élytres ornés d'une macule latérale antérieure rousse, membres en majeure partie testacés. Tête large, subtronquée en arrière; yeux gros mais assez distants entre eux et touchant le bord postérieur de la tête; antennes rembrunies à base testacée, un peu épaissies vers l'extrémité, 2° article à peu près de la longueur du 3° et du 4°, dernier à peine plus long que le précédent; prothorax à peu près de la largeur de la tête, transversal, à angles antérieurs

arrondis, densément ponctué: écusson assez distinct; élytres bien plus larges que le prothorax, assez courts, faiblement impressionnés près de la base, à ponctuation pas très forte et rapprochée; ces organes sont noirs et ornés d'une macule antérieure externe subtriangulaire rougeâtre, qui ne touche ni à la base ni au bord externe; 4 pattes antérieures grêles et testacées, postérieures un peu épaissies et en partie rembrunies. Long., 2 millim. environ.

Madagascar.

Cette espèce, voisine de la précédente, s'en distingue par son prothorax plus transversal, les élytres maculés de roux, etc. De coloration elle rappelle un peu l'*H. Decorsei* Pic, mais sa macule n'atteint pas la base des élytres et la pubescence est tout autre.

***Hylophilus madecassus* nov. sp.**

Oblongus, subnitidus, griseo pubescens, rufo-testaceus, oculis nigris, elytris ad medium bruneo fasciatis.

Oblong, un peu brillant, orné d'une pubescence grise en partie soyeuse et couchée, en partie courtement soulevée, roux testacé avec les yeux noirs, les élytres à fascie médiane brunâtre étroite et sinuée, membres testacés. Tête plus large que le prothorax, subarquée en arrière, yeux gros cependant éloignés entre eux, mais touchant le bord postérieur de la tête; antennes assez longues. épaissies à l'extrémité; à 2^e article un peu plus épais, et à peu près de la longueur du 3^e et du 4^e, dernier peu plus long que le précédent, subtronqué au sommet; prothorax presque carré, faiblement rétréci en avant, orné d'une impression transversale médiane; écusson peu marqué; élytres bien plus larges que le prothorax, pas très longs, assez fortement rétrécis vers l'extrémité, fortement ponctués, ornés d'une fascie médiane brune sinuée, parfois peu nette, et d'une petite macule, également brune, près de l'écusson, macule qui peut s'oblitérer; pattes testacées, assez grêles, postérieures comprises. Long., moins de 2 millimètres.

Madagascar (H. Perrier).

Cette espèce, qui ressemble un peu à l'*H. macularis* Pic, est plus rétrécie en arrière, les yeux sont moins gros et plus écartés et ses antennes plus grêles, etc.

***Hylophilus superbus* nov. sp.**

Oblongus, fere opacus, griseo pubescens, niger, elytris ad humeros, ad et post medium luteo maculatis aut fasciatis; pedibus pro parte testaceis.

Oblong, presque opaque, orné d'une pubescence grise, en partie soyeuse et couchée, en partie courtement soulevée, noir avec les élytres maculés

et fasciés de jaune; pattes en partie noires, en partie testacées. Tête à peine plus large que le prothorax, tronquée en arrière; yeux gros, assez rapprochés entre eux et touchant le bord postérieur de la tête; prothorax presque carré, à angles antérieurs arrondis, à faible impression basale, densément ponctuée; écusson grand, pubescent de gris; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, en ovale allongé, courttement rétrécis en arrière, subruguleusement ponctués, faiblement impressionnés près de la base, chacun de ces organes orné des dessins jaunes suivants : une macule humérale, une fascie antérieure sinuée, échancrée en avant et longuement prolongée en arrière sur le disque, une fascie postmédiane arquée, la pointe dirigée en bas du côté de la suture; pattes grêles, postérieures comprises. Long. 2-3 millimètres.

Île Bourbon.

Cette espèce des plus distinctes par ses dessins élytraux peut se placer, ainsi que la précédente, dans le voisinage de *H. macularis* Pic.

DEUX NOUVEAUX PTINIDE DES COLLECTIONS DU MUSÉUM DE PARIS,

PAR MAURICE PIC, CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Les deux espèces nouvelles décrites ici font partie de la très intéressante et précieuse Collection Fairmaire; elles sont représentées malheureusement chacune par un seul exemplaire. Le genre *Microptinus* n'était pas encore connu d'Asie; au point de vue géographique, c'est donc une découverte intéressante. Le *Ptinus* pourrait bien être le ♂ inconnu de *P. elegans* Sol. ♀, mais ce n'est pas certain; dans tous les cas, ce dernier, par sa coloration différente, ne peut pas être identifié complètement avec *P. elegans* et mérite au moins d'être regardé comme une variété de cette espèce.

***Microptinus longicornis* nov. sp.**

Brevis, apice attenuatus, nitidus, nigrometallicus, griseo aut luteo pilosus et hirsutus; antennis nigris, longissimis; pedibus satis gracilibus, rufescentibus. Asia meridionalis.

Court, atténué en arrière, brillant, orné d'une pubescence grise ou jaunâtre plus ou moins redressée et assez longue, noir métallique (extrémité des élytres et partie de l'abdomen vaguement roussâtres), avec les pattes roussâtres. Tête moyenne, un peu inclinée, avec les yeux, ceux-ci assez saillants, aussi large que le prothorax, densément et ruguleusement ponctuée; antennes noires, filiformes, très longues, un peu plus longues